

예방접종, 우리 아이를 지키는 첫걸음!

우리 몸 안에 병원균과 맞서 싸울 수 있는 면역력(항체)을 길러주는 것이 바로 백신, 예방접종입니다. 출생 시부터 적절한 시기에 예방접종을 받음으로써 면역력을 키워주고 감염병의 전파를 막아주어 우리 아이들이 무서운 질병으로부터 건강하고 안전하게 자라게 합니다.

01 예방접종 전에는

- > 아이의 건강상태를 가장 잘 알고 있는 사람이 데리고 옵니다.
- > 집에서 아이의 체온을 측정하고 열이 없는 것을 확인하고 방문합니다.
- > 아기에 예방접종수첩을 지참하고 방문합니다.
- > 접종 전날 목욕을 시키고 깨끗한 옷을 입혀서 데리고 옵니다
- > 가능하면 예방접종을 하지 않을 아이는 데리고 방문하지 않습니다.

02 예방접종 후에는

- > 접종후 20~30분간 접종기관에 머물러 아이의 상태를 관찰합니다.
- > 접종 후 최소3일간은 특별한 관심을 가지고 관찰하여 고열, 경련이 있을 때에는 곧 의사 진찰을 받도록 합니다.
- > 귀가 후 적어도 3시간 이상 주의깊게 관찰합니다.
- > 접종당일과 다음날은 과격한 운동은 삼갑니다.
- > 접종당일은 목욕을 시키지 않는 것이 좋습니다.
- > 접종부위는 청결하게 합니다
- > 아이는 반드시 바로 눕혀 재웁니다.

어린이 국가예방접종

	접종횟수	접종시기
BCG(피내용)	1회	생후 4주 이내
B형간염	3회	생후 0,1,6개월
DTaP	5회	생후 2,4,6개월, 15~18개월, 만4~6세
폴리오	4회	생후 2,4,6개월, 만4~6세
MMR	2회	생후 12~15개월, 만4~6세
수두	1회	생후 12개월
일본뇌염(사백신)	5회	생후 12개월 이후 4주간격으로 2회, 12개월 뒤 3차, 만6세, 만12세 추가접종
일본뇌염(생백신)	2회	생후 12 ~ 23개월에 1회 접종하고, 1차 접종 12개월 후 2차 접종

	접종횟수	접종시기
뇌수막염	4회	생후 2, 4, 6개월, 12 ~ 15개월
폐렴구균	4회	생후 2, 4, 6개월, 12 ~ 15개월
A형 간염	2회	생후 12, 18개월
로타바이러스(로타릭스)	2회	생후 2, 4개월
로타바이러스(로타텍)	3회	로타텍 생후 2, 4, 6 개월

예방접종도우미 누리집 바로가기

