

សូមរួមគ្នាការពារអាឡែស៊ីអាហារចំពោះទារកនិងកុមារតូច!

អាឡែស៊ីអាហារគឺជាប្រតិកម្មអាឡែស៊ីដែលអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីទទួលបានអាហារមួយចំនួនដោយបង្ហាញរោគសញ្ញា ដូចជាកន្ទួលលើស្បែក, ឈឺពោះ, ពិបាកដកដង្ហើមជាដើម។ អាឡែស៊ីអាហារកើតមានញឹកញាប់នៅវ័យទារកនិងកុមារតូច ហើយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពឬអាយុជីវិតបាន។ ដូច្នេះការជៀសវាងនិងមិនឱ្យកុមារទទួលបាន អាហារដែលបង្កអាឡែស៊ីជាមុនគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ តាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលអាហារនិងឱសថកូរ៉េ មានអាហារចំនួន22មុខដែលអាចបង្កអាឡែស៊ីបាន។ ក្នុងចំណោមនោះមានអាហារដែលយើងជួបប្រទះញឹកញាប់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចជាទឹកដោះគោ, សណ្តែកដី, ប៉េងប៉ោះជាដើម។ ដោយសារកុមារនៅតូចមិនអាចកំណត់ឬជៀសវាងអាហារ ដែលបង្កអាឡែស៊ីដោយខ្លួនឯងបានគ្រួសារនិងមណ្ឌលថែទាំកុមារ(មត្តេយ្យ)គួរសហការគ្នានិងទំនាក់ទំនងជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីការពារនិងបង្ការអាឡែស៊ីអាហារនិងជួយឱ្យកុមារលូតលាស់ប្រកបដោយសុខភាពល្អ។ សូមអានព័ត៌មានខាងក្រោមនិងសូមអណាព្យាបាលផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់និងសហការក្នុងការថែរក្សារបបអាហារដែលមានសុខភាពល្អសម្រាប់កូនៗរបស់អ្នក។

នៅមណ្ឌលថែទាំកុមារ(សាលាមត្តេយ្យ)!

នៅផ្ទះ!

- 1 ធ្វើការស្ទង់មតិអាឡែស៊ីអាហារនៅដើមឆមាស
- 2 បង្កើតគោលការណ៍ណែនាំអាឡែស៊ីអាហារហើយផ្តល់ជូន អាណាព្យាបាល
 - ព័ត៌មានចាំបាច់: ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងស្ថានភាព អាឡែស៊ីអាហារ(ឧទាហរណ៍នៃអាហារដែលបង្កអាឡែស៊ី), វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយជាក់ស្តែង(ការផ្តល់អាហារជំនួស) បង្ហាញសញ្ញាមានលើមុខម្ហូបដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន នៅក្នុងតារាងមុខម្ហូបប្រចាំខែ
- 3 ប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងអំឡុងពេលធ្វើម្ហូបនិងសកម្មភាព សិល្បៈ
 - ក្នុងករណីប្រើប្រាស់អាហារសូមលាងសម្អាតឱ្យបានស្អាត ដោយប្រើសាប៊ូសម្អាតសម្រាប់អាហារហើយពាក់ស្រោមដៃនិងម៉ាស់
 - ប្រសិនបើមានអាឡែស៊ីធ្ងន់ធ្ងរសូមជៀសវាងការប្រើប្រាស់អាហារដែលបង្កឱ្យមានអាឡែស៊ី។
- 4 ប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការស្ទង់មតិអាឡែស៊ីអាហារនិងការត្រួតពិនិត្យនៃ អាហារដែលបង្កអាឡែស៊ី(ដូចជាម្សៅស្រូវសាលី, ថង់ សណ្តែក, ប្រអប់ទឹកដោះគោជាដើម)ប៉ះនឹងរាងកាយឬ ចូលតាមផ្លូវដង្ហើមក៏អាចបណ្តាលឱ្យមានរោគសញ្ញាបានដែរ។

- 1 ពិនិត្យជាមុនថាកូនរបស់អ្នកមានប្រតិកម្មអាឡែស៊ី ចំពោះអាហារប្រភេទណាខ្លះ
 - សូមជូនដំណឹងដល់កូនរបស់អ្នកនិងមណ្ឌលថែទាំកុមារ (សាលាមត្តេយ្យ)អំពីអាហារដែលបង្កអាឡែស៊ីបានធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យថាបង្កអាឡែស៊ី
- 2 ចូលរួមការស្ទង់មតិអាឡែស៊ីអាហាររបស់មណ្ឌលថែទាំ កុមារ
 - សូមបំពេញព័ត៌មានអំពីមានឬគ្មានអាឡែស៊ីអាហារ, ប្រភេទអាហារដែលបង្កអាឡែស៊ី, រោគសញ្ញាអាឡែស៊ីនិង អាហារដែលអាចប្រើជំនួសបាន។
- 3 សូមពិនិត្យមើលបញ្ជីមុខម្ហូបនិងមុខម្ហូបជំនួសរបស់ មណ្ឌលថែទាំកុមារ, ប្រសិនបើចង់រៀបចំអាហារជំនួសពី ផ្ទះយកមកបាន។
- 4 នៅពេលអាឡែស៊ីបានជាសះស្បើយសូមដាក់លិខិត បញ្ជាក់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតជូនមណ្ឌលថែទាំកុមារ។
- 5 នៅពេលទិញផលិតផល, សូមពិនិត្យមើលស្លាកសញ្ញា 'អាហារដែលអាចបង្កអាឡែស៊ី'ដែលបានបង្ហាញនៅលើ ស្លាកផលិតផលអាហារ។

អាហារចំនួន22 ប្រភេទដែលក្រសួងសុខាភិបាលអាហារនិងឱសថកូរ៉េកំណត់ថាជាអាហារបង្កអាឡែស៊ី

រោគសញ្ញាសំខាន់ៗនៃអាឡែស៊ី



- **ក:** បំពង់កតឹងឬពិបាកដកដង្ហើម, សំឡេងស្លុក, ក្អកជាដើម
- **ស្បែក:** រមាស់, ក្រហម, កន្ទួលកហម, ហើម
- **ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ:** ក្អួត, ឈឺពោះ, រាគ, ចង់ក្អួតជាដើម
- **អាណាហ្វ្វិឡាក់ស៊ី:** សម្ពាធឈាមទាបនិងពិបាកដកដង្ហើម

ព័ត៌មានអំពីអាហារជំនួស

គោលការណ៍! ដើម្បីឱ្យកុមារទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់និងមានតុល្យភាពសូមជំនួសអាហារដែលបង្កអាឡែស៊ីដោយអាហារផ្សេងទៀតដែលស្ថិតក្នុងក្រុមអាហារដូចគ្នា។

អាហារដែលអាចបង្កអាឡែស៊ី	អាហារជំនួស	អាហារដែលអាចបង្កអាឡែស៊ី	អាហារជំនួស
ទឹកដោះគោ	ទឹកសណ្តែក, ត្រីអាន់ឆ្វី, តោហ្វូ	ម្សៅស្រូវសាលី	ស្រូវបារាំង, អង្ករ, អូតមីល, ពោត, មីស្រូវ, នំអង្ករ
សណ្តែក	ត្រីឆ្កែណា, ឈើស, ត្រីសំបាក់, សាច់គោ, សាច់ជ្រូក	ស៊ុត	ត្រីសាច់ស, សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, តោហ្វូ
សណ្តែកដី	ជំនួសដោយប្រេងដែលមានប្រភពពីរុក្ខជាតិដែលមិនមែនជាប្រេងពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិ	គ្រឿងសមុទ្រ	សាច់សត្វ, តោហ្វូ, ស៊ុត, ផ្សិតខ្មៅ, ផ្សិតត្រចៀកឈើ